

Када се не може дати крв

Селекција давалаца се врши према установљеним, искључиво медицинским, критеријумима за привремено одлагање давања крви или трајно одбијање због неподобности за давање крви, било да би давање крви могло да угрози потенцијалног даваоца или примаоца. На избор давалаца никако нема утицаја пол, религија, националност, сексуално опредељење, политичка оријентисаност, занимање, социјални статус или неки други сличан разлог.

Систем органа / орган / категорија	Назив обољења / стања	Трајање (дани)
Срце	Хипотензија <13,3/8,66 (100/60 ммХг)Anna	*
	Бенигна хипертензија >24/13,3 (180/100 ммХг)	*
Акутне инфективне и запаљенске болести (после излечења)	Акутни гломерулонефритис	(5 г) 1800
	Акутна токсоплазмоза	180
	Бруцелоза	730
	Гастроинтестиналне инфекције	730
	Гнојна кожна обољења	14
	Гонореја	180
	Херпес симплекс	14
	Херпес зостер	120
	Инфективна моноклеоза	360
	Лајмска болест	360
	Лакше инфективне болести (ринитис, прехлада, грип и сл.)	7
	Остеомијелитис	730
	Респираторне инфекције	14

	Реуматска грозница	730
	Рубеола, паротистис	21
	Тиреотоксикоза	180
	Трихинелоза	730
	Туберкулоза плућа и других органа	730
	Уринарне инфекције	21
	Запаљење плућа	90
	Заразна жутица типа А	90
После узимања лекова	Антибиотици	7
	Антикоагуланси	14
	Аспирин (замене), Наркохеп, Пирохицам	5
	Бруфен, Волтарен/ Диклофен и слично	2
	Диуретици и антихипертензив	1 do 5
	Цилазаприл- антихипертензив	10
	Амлодипин- антихипертензив	7
	Диуретици и антихипертензив	14
	Стероиди	***
Вакцинације	Живим микроорганизмима (рубеола)	28
	Живим атенуираним микроорганизмима: БЦГ, рубеола, морбили, заушке, полио- орално, жута грозница, тифус, колера	28
	Мртвим микроорганганизмима као колера, тифус	0
	Против беснила	360
	Токсоиди (дифтерија, тетанус)	0
	Вакцине са инактивисаним вирусима (инфлуенца, полиомијелит и.м.)	0

	Вакцине против хепатитиса А и Б, дате као последица излагања вирусима	180
	Друге вакцине дате превентивно (хепатитис А и Хепатитис Б)	0
Превенција	Акупунктура	180
	Инокулационе повреде	180
	Контакт (у кући) са оболелим од заразне жутице типа А	90
	Контакт (у кући) са оболелим од заразне жутице типа А	180
	Сексуални однос или крвни контакт са особом оболелом од ХБВ и/или ХЦВ или особом која је ХБсАГ+ и/или ХЦВ+	180
	Контакт са оболелим од сифилиса	90
	Тетовирање и пробадање тела, коже (пирсинг)	180
	Вакцинисање и/или примена серума због контакта са оболелим од заразне жутице типа Б	180
	Вакцинисање због контакта са оболелим од заразне жутице типа А	42
Остало	Амбулантне хируршке интервенције	7
	Ендоскопија са биопсијом	180
	Менструација	*****
	Побачај	180
	Порођај	180
	Ткивни и ћелијски трансплантати	180
	Трудноца	180
	Трансфузија крви	180
	Вађење зуба и мање стоматолошке интервенције	7
	Веће хируршке интервенције	180

	Низак хемоглобин	7
	Акутни етилизам	1
	Варицес црурис великог обима	60
	Акутна алергија	15
	Жучни и бубрежни каменци-акутни напад	15
	Акутни холециститис	30
	Епилепсија без терапије	(3г)1095
	Астенија	*****
*	до нормализације	
**	ако се плазма узима искључиво за фракционисање	
***	према фармакокинезици лека	
****	од последњег сексуалног контакта	
*****	за време трајања	

Критеријуми за ТРАЈНО одбијање давалаца

Систем органа / орган / категорија	Назив обољења / стања
Сви системи и органи	Хронична системска обољења са инсуфицијенцијом органа
Сви системи и органи	Малигна обољења свих система и органа
Сви системи и органи	Хронична системска обољења са инсуфицијенцијом органа
Срце	Малигна хипертензија Ангина пекторис Апсолутна аритмија и ВЕС Коронарна болест Операције на срцу Срчане мане
Плућа	Астма Хронична опструктивна болест плућа

	Емфизем плућа
Дигестивни тракт	Хронична остећења јетре неинфективног порекла Хронична остећења панкреаса неинфективног порекла Улцерозни колитис
Ендокрини систем	Хипо и хипертиреозидоза са трајном супституционом терапијом Шећерна болест - инсулин зависна Адисонова болест Акромегалија
Цереброваскуларни систем	Епилепсија под терапијом Психоза, психопатија, ментална ретардација Стања после инсульта
Крв	Урођене коагулопатије Стечене коагулопатије
Крвни судови	Артеријска тромбоза Рекурентне венске тромбозе
Хроничне инфективне и запаљенске болести	Тропске болести (лајшманиоза, бабезиоза, хронична Q грозница, трипанозомиаза крузи - Шагасова болест) Носиоци ХИВ 1/2 Хепатитис Б Хепатитис Ц Сифилис ЦЈД и друге спонгиформне енцефалопатије Прионска обољења Маларија Хронична токсоплазмоза
Хроничне аутоимуне болести	Хронични екцем Кронова болест Мултипла склероза Псоријаза Витилиго Реуматоидни артритис Саркоидоза Системски лупус Тромбоцитопенија
Ризично понашање	Високо ризично сексуално понашање Хронични алкохолизам Наркоманија
Остало	Поновљени колапси при давању крви Примаоци трансплантата

При конзумирању већине лекова, потребно је да прође 5 полуживота елиминације лека из организма, да би се лек елиминисао више од 90% из крви. Исто толико времена је потребно да прође од попијеног лека и давања крви, уколико је могуће из здравствених разлога да особа буде то време без лека (на пример антихипертензивних лекова). Детаљне информације о разлозима за одлагање давања крви се добијају од лекара на лекарском прегледу.